

Esquema per facilitar el càlcul de la dosis de N-Acetilcisteína (NAC) en funció del pes

1^a DOSIS:

100 mg/kg en 500cc SG 5% o SF en 2 horas

2^a DOSIS:

200 mg/kg en 500cc SG 5% o SF en 10 horas

PRESCRIPCIÓN DE ACETILCISTEÍNA en adultos								
PAUTA	1 ^a DOSIS			2 ^a DOSIS				
	Solución	500 mL de SG 5% o SF		Solución	500 mL de SG 5% o SF			
Duración perfusión	2 horas			10 horas				
	Dosis producto	100 mg/kg paciente		200 mg/kg paciente				
Peso del paciente	Dosis	Volumen vial	Velocidad perfusión	Dosis	Volumen vial	Velocidad perfusión		
Kg	gr	mL	mL/h	gr	mL	mL/h		
40-49	4,5	22,5	250 mL/h	9	45	50 mL/h		
50-59	5,5	27,5		11	55			
60-69	6,5	32,5		13	65			
70-79	7,5	37,5		15	75			
80-89	8,5	42,5		17	85			
90-99	9,5	47,5		19	95			
100-109	10,5	52,5		21	105			
≥ 110 (dosis máxima)	11	57		22	110			



20%: 200mg/mL
Vial de 25ml= 5gr

